



Suprasorb® Liquacel* NEU

Hydroaktiver Faserverband



Anwendungsbereiche

- Sekundär heilende Wunden wenn sie exsudierend und oberflächliche bis tief sind
- Chronische Wunden, z.B.:
 - Ulcus cruris
 - Dekubitus
 - Diabetische Ulzera
- Akute Wunden, z. B.:
 - Riss-, Schnitt und Schürfwunden
 - Verbrennungen zweiten Grades
- Traumatische Wunden und Wunden die zur Blutung neigen, z. B.:
 - Nach chirurgischem oder mechanischem Debridement
- Post-chirurgische Wunden, z. B.:
 - Spalthautentnahmestellen

Eigenschaften

- wirkt unterstützend beim Schutz vor Mazeration von Wundrand und Wundumgebungshaut
- effektives Wundheilung durch effektives Exsudatsmanagement
- unkomplizierte Anwendung im feuchten Zustand und in einem Stück entfernbar

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 7 Tagen

Kontraindikationen:

Verbrennungen 3. Grades

Ausführungen

- Kompresse
- Tamponade

Empfohlene Kombinationen

- Suprasorb P, Suprasorb H, Vliwasorb, Vliwazell

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende in vitro Daten.

Suprasorb® Liquacel NEU Hydroaktiver Faserverband
steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharmacode	VE (Stk.)
Kompresse			
5 x 5	33 435	558 534 7	10 / 100
10 x 10	33 436	558 535 3	10 / 100
15 x 15	33 437	558 537 6	5 / 50
Tamponade			
2 x 45	33 438	558 538 2	5 / 50